Смешивание удобрений Hydro

Подготовка – половина дела. Прежде чем начать смешивать удобрения в резервуаре, проверьте, что у вас есть все необходимое, а особенно подходящие удобрения: Vega или Flores, Hard или Soft, компонент A или B.

1. Наполните чистый резервуар водой из-под крана (температура воды предпочтительно около 20-22°C). Воду такой температуры можно сразу налить из-под крана или использовать нагревательный прибор для аквариумов.
2. Затем, учитывая уровень EC воды, добавьте CANNA Hydro A в воду, тщательно перемешайте
3. Отмерьте и добавьте ровно такое же количество CANNA Hydro B и снова тщательно перемешайте.

a. Используя EC-метр, проверьте, содержит ли раствор достаточное количество солей. Если уровень EC слишком низкий, добавьте еще удобрений. Если EC слишком высокий – добавьте больше воды. Делать это надо с предельной внимательностью и точностью.

b. Проделывая все это в первый раз, запишите, в каких количествах вы использовали удобрения. Это поможет вам в следующий раз!

4. И в заключение, рекомендуем перед применением дать свежеприготовленному раствору некоторое время отстояться. Это позволит всем веществам полностью раствориться и стабилизироваться.

Когда растение становится крупнее, оно может поглощать больше удобрений и таким образом развиваться еще быстрее. Поэтому полезно увеличить дозу удобрений в питательном растворе, когда растения стали больше. Количество удобрений и время их применения указаны в памятке ниже, однако не забывайте, что все данные обобщены и примерны. С опытом вы сможете начать экспериментировать, чтобы максимизировать свои урожаи.

Совет **Регулярно измеряйте уровень EC не только питательного раствора и дренажной воды, но и уровень EC самого субстрата.**

Совет **Вы легко сможете отличить компоненты CANNA Hydro A и B, потому что содержимое A – цветное, а B – бесцветное.**

Growguide

CANNA HYDRO

		Период роста в неделях	Световой период в часах	Hydro Vega мл A\10 литров мл B\10 литров	Hydro Flores мл A\10 литров мл B\10 литров	RHIZOTONIC мл\10 литров	CANNAZYM мл\10 литров	CANNABOOST мл\10 литров	PK 13/14 мл\10 литров	EC + мс\см	Общий EC мс\см
	ВЕГЕТАТИВНАЯ ФАЗА										
РОСТ	**Старт\укоренение (3-5 дней)** - намочите субстрат	<1	18	10-20	-	40	-	-	-	0.7 - 1.1	1.1 - 1.5
РОСТ	**Вегетативная фаза I** - Развитие растений в объеме	0-3[1]	18	15-25	-	20	25	-	-	0.9-1.3	1.3-1.7
ЦВЕТЕНИЕ	**Вегетативная фаза II** - вплоть снижение темпов роста с последующим плодоношением или образованием цветов	2-4[2]	12	20-30	-	20	25	20[5]	-	1.2-1.6	1.6-2.0
	ГЕНЕРАТИВНАЯ ФАЗА										
ЦВЕТЕНИЕ	**Генеративный период I** - Развитие соцветий или плодов в длину. Достигнут рост в высоту	2-3	12	-	25-35	5	25	20-40	-	1.4-1.8	1.8-2.2
ЦВЕТЕНИЕ	**Генеративный период II** - Развитие объема (в ширину) соцветий или плодов	1	12	-	25-35	5	25	20-40	15	1.5-1.9	1.9-2.3
ЦВЕТЕНИЕ	**Генеративный период III** - Набор массы (веса) соцветий или плодов	2-3	12	-	15-25	5	25	20-40	-	1.0-1.4	1.4-1.8
ЦВЕТЕНИЕ	**Генеративный период IV** - процесс созревания соцветий или плодов	1-2	10-12[3]	-	-	-	25-50[4]	20-40	-	0.0	0.4

1. Длительность данного периода зависит от вида растений и их количества на кв.м. Материнские растения остаются на этой фазе до самого конца (6-12 месяцев).
2. Переход с 18 на 12 часов варьируется в зависимости от разновидности растения.
   Доказано практикой, что это оптимально через 2 недели.
3. Сократите время освещения, если созревание происходит слишком быстро. Следите за относительной влажностью.
4. Удвойте дозу CANNAZYM (50мл\10л), если используете субстрат повторно.
5. 20мл\10 литров – стандарт. Увеличьте до 40мл\10 литров максимум для дополнительной силы цветения.

EC: Уровень EC+ основан на мС\см при EC воды = 0.0 при 25°C, pH 6.0.
Повысьте EC воды из-под крана до рекомендованного! Общий EC в примере основан на воде из крана с EC 0.4.

pH: Рекомендованный уровень pH между 5.2 и 6.2.
Увеличение pH- может увеличить и EC.
Используйте pH- grow на вегетативной фазе, чтобы понизить pH.
Используйте pH- bloom на генеративной фазе, чтобы понизить pH.

Предписания в таблице не обязывают к их неизменному использованию, но могут помочь начинающим садоводам разработать сложную стратегию питания растений. Оптимальная стратегия питания определяется следующими факторами: температура, влажность, особенности растения, объем корневой системы, процент содержания влаги в субстрате, дозировка воды, и т.д.

Создай свой график питания на www.canna-ru.com

©CANNA RU 0816

CANNA, информационный ресурс

Если эта брошюра была полезна для вас, вы также могут заинтересовать и другие источники информации: CANNA Основная Брошюра и CANNA брошюры о продуктах CANNA HYDRO, CANNA RHIZOTONIC, CANNAZYM, CANNA PK13/14 и CANNABOOST. Также доступно онлайн.

www.canna-ru.com

www.svetisad.ru

CANNA
Thé solution for growth and bloom